



Diagnostica per Immagini
Teleradiologia
Direttore Sanitario
Dott. Giacomo Barbalace



PT 34 Rev.00 del 17/03/2021
Protocollo VACCINAZIONE Astrazeneca

CONSENSO INFORMATO
VACCINAZIONE ANTI COVID-19
Astrazeneca
PT34

SEZIONE A

MODULO CONSENSO

Nome e Cognome:	
Data di nascita	Luogo di nascita:
Residenza:	Telefono:
Tessera sanitaria (se disponibile): N.	



Diagnostica per Immagini
Teleradiologia
Direttore Sanitario
Dott. Giacomo Barbalace



PT 34 Rev.00 del 17/03/2021
Protocollo VACCINAZIONE Astrazeneca

Ho letto, mi è stata illustrata in una lingua nota ed ho del tutto compreso la Nota Informativa in sezione B, di cui ricevo copia.

Ho compilato in modo veritiero e ho riesaminato con il Personale Sanitario la Scheda Anamnestica in sezione C.

In presenza di due Professionisti Sanitari addetti alla vaccinazione ho posto domande in merito al vaccino e al mio stato di salute ottenendo risposte esaurienti e da me comprese.

Sono stato correttamente informato con parole a me chiare, ho compreso i benefici ed i rischi della vaccinazione, le modalità e le alternative terapeutiche, nonché le conseguenze di un eventuale rifiuto o di una rinuncia al completamento della vaccinazione con la seconda dose.

Sono consapevole che qualora si verificasse qualsiasi effetto collaterale sarà mia responsabilità informare immediatamente il mio Medico curante e seguirne le indicazioni.

Accetto di rimanere nella sala d'aspetto per almeno 15 minuti dalla somministrazione del vaccino per assicurarsi che non si verifichino reazioni avverse immediate.

Acconsento ed autorizzo la somministrazione della vaccinazione mediante Vaccino "COVID-19 AstraZeneca"

Data e Luogo.....

Firma della Persona che riceve il vaccino o del suo Responsabile legale.....

(Allegare copia del documento di identità del Rappresentante legale)

Rifiuto la somministrazione del vaccino "COVID 19 AstraZeneca".

Data e Luogo.....

Firma della Persona che rifiuta il vaccino o del suo Rappresentante legale.....

(Allegare copia del documento di identità del Rappresentante legale)

Professionisti sanitari dell'equipe vaccinale

1. Nome e Cognome Ruolo.....

Confermo che il Vaccinando ha espresso il suo consenso alla vaccinazione, dopo essere stato adeguatamente informato.

Firma

2. Nome e Cognome Ruolo

Confermo che il Vaccinando ha espresso il suo consenso alla vaccinazione, dopo essere stato adeguatamente informato.

Firma



Diagnostica per Immagini
Teleradiologia
Direttore Sanitario
Dott. Giacomo Barbalace



PT 34 Rev.00 del 17/03/2021
Protocollo VACCINAZIONE AstraZeneca

SEZIONE B Allegato al modulo di consenso informato NOTA INFORMATIVA

Cos'è il Vaccino COVID-19 AstraZeneca e a cosa serve

Il Vaccino COVID-19 AstraZeneca è un vaccino utilizzato per la prevenzione di COVID-19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2. Il Vaccino COVID-19 AstraZeneca viene somministrato agli adulti di età pari o superiore a 18 anni. Il vaccino induce il sistema immunitario (le difese naturali dell'organismo) a produrre gli anticorpi e le cellule del sangue attive contro il virus, conferendo così una protezione anti COVID-19. Nessuno dei componenti di questo vaccino può provocare COVID-19.

Cosa deve sapere prima di ricevere il Vaccino COVID-19 AstraZeneca

Il Vaccino COVID-19 AstraZeneca non deve essere somministrato se è allergico al principio attivo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati di seguito).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o all'operatore sanitario del centro vaccinale prima di ricevere il vaccino se:

- Ha avuto una grave reazione allergica o problemi respiratori dopo l'iniezione di un altro vaccino o dopo avere ricevuto il Vaccino COVID-19 AstraZeneca in passato;
- È svenuto dopo un'iniezione;
- Ha una malattia o un'infezione grave con febbre alta. Tuttavia, se ha una febbre lieve o un'infezione delle vie respiratorie superiori (come un raffreddore) potrà comunque ricevere la vaccinazione;
- Ha un problema di sanguinamento, una tendenza alla formazione di lividi, o se usa medicinali per prevenire la formazione di coaguli di sangue;ù
- Il suo sistema immunitario non funziona correttamente (immunodeficienza) o sta assumendo medicinali che indeboliscono il sistema immunitario (come corticosteroidi ad alto dosaggio, immunosoppressori o medicinali antitumorali).

In seguito alla somministrazione del Vaccino COVID-19 AstraZeneca è stata osservata molto raramente una combinazione di coaguli di sangue e livelli bassi di piastrine, in alcuni casi con la presenza di sanguinamento. In alcuni casi gravi si sono manifestati coaguli di sangue in posizioni diverse o insolite come pure coagulazione o sanguinamento eccessivi in tutto il corpo. I casi più gravi segnalati sono molto rari: circa 20 milioni di persone in Europa (incluso il Regno Unito) hanno ricevuto il vaccino al 16 marzo 2021 e l'EMA (Agenzia europea dei medicinali) ha riscontrato 7 casi di trombi in più vasi sanguigni (coagulazione intravascolare disseminata, CID) e



Diagnostica per Immagini
Teleradiologia
Direttore Sanitario
Dott. Giacomo Barbalace



PT 34 Rev.00 del 17/03/2021
Protocollo VACCINAZIONE AstraZeneca

18 casi di trombosi cerebrale. La maggior parte di questi casi si è verificata entro i primi sette-quattordici giorni successivi alla vaccinazione e si è verificata principalmente in donne sotto i 55 anni di età. Tuttavia, un numero maggiore di donne sotto i 55 anni ha ricevuto il vaccino rispetto ad altre persone. Alcuni casi hanno avuto esito fatale.

Rivolgersi immediatamente a un medico in caso di respiro affannoso, dolore al petto, gonfiore alle gambe o dolore addominale persistente dopo la vaccinazione.

Inoltre, consultare immediatamente un medico se, dopo alcuni giorni, si verificano mal di testa gravi o persistenti o visione offuscata dopo la vaccinazione, o se dopo pochi giorni compaiono lividi sulla pelle o chiazze rotonde in un punto diverso dal sito di vaccinazione.

Il comitato per la valutazione dei rischi per la farmacologia (PRAC) dell'EMA, nella riunione straordinaria del 18 marzo 2021, ha concluso che i benefici del Vaccino COVID-19 AstraZeneca nel combattere la minaccia ancora diffusa del COVID-19 (che a sua volta provoca problemi di coagulazione e può essere fatale) continuano a superare il rischio di effetti indesiderati. Il vaccino non è associato ad un aumento del rischio complessivo di eventi legati a trombi (eventi tromboembolici) in coloro che lo ricevono

(<https://www.aifa.gov.it/-/covid-19-vaccine-astrazeneca-benefits-still-outweigh-the-risks-despite-possible-link-to-rare-blood-clots-with-low-blood-platelets>).

Altri medicinali e Vaccino COVID-19 AstraZeneca

Informi il medico o l'operatore sanitario del centro vaccinale se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale, o se le è stato somministrato di recente qualsiasi altro vaccino.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte materno, chiedi consiglio al medico prima di ricevere questo vaccino.

I dati relativi all'uso del Vaccino COVID-19 AstraZeneca in donne in gravidanza sono limitati. Gli studi sugli animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti su gravidanza, sviluppo embrionale/fetale, parto o sviluppo post-natale. La somministrazione del Vaccino COVID-19 AstraZeneca durante la gravidanza deve essere presa in considerazione solo quando i potenziali benefici sono superiori ai potenziali rischi per la madre e per il feto.



Diagnostica per Immagini
Teleradiologia
Direttore Sanitario
Dott. Giacomo Barbalace



PT 34 Rev.00 del 17/03/2021
Protocollo VACCINAZIONE AstraZeneca

Durata della protezione e limitazioni dell'efficacia del vaccino

La durata della protezione offerta dal vaccino non è nota; sono tuttora in corso studi clinici volti a stabilirla. La protezione inizia da circa 3 settimane dopo la prima dose del Vaccino COVID-19 AstraZeneca. I soggetti potrebbero non essere completamente protetti fino a 15 giorni dopo la somministrazione della seconda dose. Come con tutti i vaccini, la vaccinazione con il Vaccino COVID-19 AstraZeneca potrebbe non proteggere tutti i soggetti vaccinati. E' pertanto essenziale continuare a seguire scrupolosamente le raccomandazioni di sanità pubblica (mascherina, distanziamento e lavaggio frequente delle mani).

Come viene somministrato il Vaccino COVID-19 AstraZeneca

Il Vaccino COVID-19 AstraZeneca viene somministrato dopo diluizione sotto forma di iniezione intramuscolare nella parte superiore del braccio. E' previsto un richiamo ed è raccomandabile che la seconda dose dello stesso vaccino sia somministrata circa 12 settimane dopo la prima dose per completare il ciclo di vaccinazione.

E' molto importante che venga eseguita la seconda somministrazione per ottenere una risposta immunitaria ottimale. Qualora dimenticasse di tornare alla data prestabilita per la seconda somministrazione si rivolga al suo medico curante o al centro vaccinale dove è stata somministrata la prima dose.

Possibili effetti indesiderati

Con COVID-19 Vaccine AstraZeneca possono verificarsi i seguenti effetti indesiderati: Come tutti i vaccini, il Vaccino COVID-19 AstraZeneca può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino. Richieda assistenza medica **urgente** se si manifestano sintomi di grave reazione allergica. Tali reazioni possono includere una combinazione di uno qualsiasi dei seguenti sintomi:

- Sensazione di svenimento o stordimento
- Cambiamenti nel battito cardiaco
- Fiato corto
- Respiro sibilante
- Gonfiore delle labbre, del viso o della gola
- Orticaria o eruzione cutanea
- Nausea o vomito
- Mal di stomaco

Con COVID-19 Vaccine AstraZeneca possono verificarsi i seguenti effetti indesiderati:



Diagnostica per Immagini
Teleradiologia
Direttore Sanitario
Dott. Giacomo Barbalace



PT 34 Rev.00 del 17/03/2021
Protocollo VACCINAZIONE Astrazeneca

Effetti indesiderati molto comuni (possono interessare più di 1 persona su 10)

- Dolorabilità, dolore, calore, prurito o lividi nel punto in cui viene praticata l'iniezione
- Sensazione di stanchezza (affaticamento) o sensazione di malessere generale
- Brividi o sensazione di febbre
- Mal di testa
- Sensazione di malessere (nausea)
- Dolore alle articolazioni o dolore muscolare

Effetti indesiderati comuni (possono interessare fino a 1 persona su 10):

- Gonfiore o arrossamento nel punto in cui viene praticata l'iniezione
- Febbre (>38°)
- Malessere (vomito) o diarrea

Effetti indesiderati non comuni (possono interessare fino a 1 persona su 100):

- Sonnolenza o sensazioni di vertigini
- Diminuzione dell'appetito
- Ingrossamento dei linfonodi
- Sudorazione eccessiva, prurito o eruzione cutanea

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, anche se non elencati di sopra, si rivolga al medico curante o contatti il centro vaccinale.

Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione (<https://www.aifa.gov.it/content/segalazioni-reazioni-avverse>).

Cosa contiene il Vaccino COVID-19 AstraZeneca

Il principio attivo è un adenovirus di scimpanzé non in grado di replicarsi che codifica per la glicoproteina spike del SARS-CoV-2.

Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati (OGM).

Gli altri eccipienti sono: L-istidina; L-istidina cloridrato monoidrato; cloruro di magnesio esaidrato; polisorbato 80 (E433); saccarosio; disodio esetato (diidrato); acqua per preparazioni iniettabili.



Diagnostica per Immagini
Teleradiologia
Direttore Sanitario
Dott. Giacomo Barbalace



PT 34 Rev.00 del 17/03/2021
Protocollo VACCINAZIONE Astrazeneca

SEZIONE C

Allegato al modulo di consenso informato SCHEDA ANAMNESTICA

Da compilare a cura del Vaccinando e da riesaminare insieme ai Professionisti Sanitari addetti alla vaccinazione

Nome e Cognome	Telefono:		
Anamnesi	SI	NO	NON SO
Attualmente è malato?			
Ha febbre?			
Soffre di allergie al lattice, a qualche cibo, a farmaci o ai componenti del vaccino? Se si specificare:.....			
Ha mai avuto una reazione grave dopo aver ricevuto un vaccino?			
Soffre di malattie cardiache o polmonari, asma, malattie renali, diabete, anemia o altre malattie del sangue?			
Si trova in una situazione di compromissione del sistema immunitario? (es. cancro, leucemia, linfoma HIV/AIDS, trapianto?)			
Negli ultimi 3 mesi ha assunto farmaci che indeboliscono il sistema immunitario (es cortisone prednisione) o farmaci antitumorali, oppure ha subito trattamenti con radiazioni?			
Durante lo scorso anno, ha ricevuto una trasfusione di sangue o prodotti ematici, oppure le sono stati somministrati immunoglobuline (gamma) o farmaci antivirali?			
Ha avuto attacchi di convulsioni o qualche problema al cervello o al sistema nervoso?			
Ha ricevuto vaccinazioni nelle ultime 4 settimane? Se si quali/e?.....			
Per le donne: è in cinta o sta pensando di rimanere incinta nel mese successivo alla prima o alla seconda vaccinazione?			



Diagnostica per Immagini
 Teleradiologia
 Direttore Sanitario
 Dott. Giacomo Barbalace



PT 34 Rev.00 del 17/03/2021
Protocollo VACCINAZIONE Astrazeneca

Sta allattando?			
-----------------	--	--	--

Specifichi di seguito i farmaci, ed in particolare quelli anticoagulanti, nonché gli integratori naturali, le vitamine, i minerali o eventuali medicinali alternativi che sta assumendo:

.....

Anamnesi COVID correlata	SI	NO	NON SO
Nell'ultimo mese è stato in contatto con una persona contagiata da Sars-CoV2 o affetta da COVID-19			
Manifesta uno dei seguenti sintomi:			
• Tosse/raffreddore/febbre/dispnea o sintomi simil-influenzali			
• Mal di gola/perdita dell'olfatto o del gusto?			
• Dolore addominale/diarrea?			
• Lividi anormali o sanguinamento/arrossamento degli occhi?			
Hai fatto qualche viaggio internazionale nell'ultimo mese?			
Test COVID 19:			
• Nessun test COVID-19 recente			
• Test Covid-19 negativo (Data.....)			
• Test COVID-19 positivo (Data.....)			
• In attesa di test COVID-19 (Data.....)			



Diagnostica per Immagini
Teleradiologia
Direttore Sanitario
Dott. Giacomo Barbalace



PT 34 Rev.00 del 17/03/2021
Protocollo VACCINAZIONE Astrazeneca

Riferisca altre patologie o notizie utili sul Suo stato di salute:

.....
.....
.....
.....
.....

Documento approvato dal Direttore Sanitario