



Diagnostica per Immagini
Teleradiologia
Direttore Sanitario
Dott. Giacomo Barbalace



PT 34 Rev.00 del 17/03/2021
Protocollo vaccinazione Pfizer BioNTech

CONSENSO INFORMATO

VACCINAZIONE ANTI COVID-19 Pfizer- BioNTech

PT34

SEZIONE A

MODULO CONSENSO

Nome e Cognome:	
Data di nascita	Luogo di nascita:
Residenza:	Telefono:
Tessera sanitaria (se disponibile): N.	



Diagnostica per Immagini
Teleradiologia
Direttore Sanitario
Dott. Giacomo Barbalace



PT 34 Rev.00 del 17/03/2021
Protocollo vaccinazione Pfizer BioNTech

Ho letto, mi è stata illustrata in una lingua nota ed ho del tutto compreso la Nota Informativa in sezione B, di cui ricevo copia.

Ho compilato in modo veritiero e ho riesaminato con il Personale Sanitario la Scheda Anamnestica in sezione C.

In presenza di due Professionisti Sanitari addetti alla vaccinazione ho posto domande in merito al vaccino e al mio stato di salute ottenendo risposte esaurienti e da me comprese.

Sono stato correttamente informato con parole a me chiare, ho compreso i benefici ed i rischi della vaccinazione, le modalità e le alternative terapeutiche, nonché le conseguenze di un eventuale rifiuto o di una rinuncia al completamento della vaccinazione con la seconda dose.

Sono consapevole che qualora si verificasse qualsiasi effetto collaterale sarà mia responsabilità informare immediatamente il mio Medico curante e seguirne le indicazioni.

Accetto di rimanere nella sala d'aspetto per almeno 15 minuti dalla somministrazione del vaccino per assicurarsi che non si verifichino reazioni avverse immediate.

Acconsento ed autorizzo la somministrazione della vaccinazione mediante vaccino "Pfizer-BioNTech COVID-19"

Data e Luogo.....

Firma della Persona che riceve il vaccino o del suo Responsabile legale.....

(Allegare copia del documento di identità del Rappresentante legale)

Rifiuto la somministrazione del vaccino "Pfizer-BioNTech COVID 19".

Data e Luogo.....

Firma della Persona che rifiuta il vaccino o del suo Rappresentante legale.....

(Allegare copia del documento di identità del Rappresentante legale)

Professionisti sanitari dell'equipe vaccinale

1. Nome e Cognome Ruolo.....

Confermo che il Vaccinando ha espresso il suo consenso alla vaccinazione, dopo essere stato adeguatamente informato.

Firma

2. Nome e Cognome Ruolo

Confermo che il Vaccinando ha espresso il suo consenso alla vaccinazione, dopo essere stato adeguatamente informato.

Firma



Diagnostica per Immagini
Teleradiologia
Direttore Sanitario
Dott. Giacomo Barbalace



PT 34 Rev.00 del 17/03/2021
Protocollo vaccinazione Pfizer BioNTech

SEZIONE B Allegato al modulo di consenso informato NOTA INFORMATIVA

COMIRNATY (BioNTech/Pfizer)

Cos'è Comirnaty e a cosa serve

Comirnaty è un vaccino utilizzato per la prevenzione del COVID-19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2. Comirnaty viene somministrato agli adulti e agli adolescenti di età pari o superiore a 16 anni. Il vaccino induce il sistema immunitario (le difese naturali dell'organismo) a produrre gli anticorpi e le cellule del sangue attive contro il virus, conferendo così una protezione anti COVID-19. Poiché Comirnaty non contiene il virus per indurre l'immunità, non può trasmettere COVID-19.

Cosa deve sapere prima di ricevere Comirnaty

Comirnaty non deve essere somministrato se è allergico al principio attivo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati di seguito).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o all'operatore sanitario del centro vaccinale prima di ricevere il vaccino se:

- Ha avuto una grave reazione allergica o problemi respiratori dopo l'iniezione di un altro vaccino o dopo aver ricevuto Comirnaty in passato;
- È svenuto dopo un'iniezione;
- Ha una malattia o un'infezione grave con febbre alta. Tuttavia, se ha una febbre lieve o un'infezione delle vie respiratorie superiori (come raffreddore) potrà comunque ricevere la vaccinazione;
- Ha un problema di sanguinamento, una tendenza alla formazione di lividi, o se usa medicinali per prevenire la formazione di coaguli di sangue;
- Ha un sistema immunitario indebolito, a causa di una malattia come l'infezione HIV, o di medicinali che influenzano il sistema immunitario, come i corticosteroidi.

Altri Medicinali e Comirnaty

Informi il medico o l'operatore sanitario del centro vaccinale se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale, o se le è stato somministrato di recente qualsiasi altro vaccino.



Diagnostica per Immagini
Teleradiologia
Direttore Sanitario
Dott. Giacomo Barbalace



PT 34 Rev.00 del 17/03/2021
Protocollo vaccinazione Pfizer BioNTech

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte materno, chiedi consiglio al medico prima di ricevere questo vaccino.

I dati relativi all'uso di Comirnaty in donne in gravidanza sono limitati. Gli studi sugli animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti su gravidanza, sviluppo embrionale/fetale, parto o sviluppo post-natale. La somministrazione di Comirnaty durante la gravidanza deve essere presa in considerazione solo quando i potenziali benefici sono superiori ai potenziali rischi per la madre e per il feto.

Durata della protezione e limitazioni dell'efficacia del vaccino

La durata della protezione offerta dal vaccino non è nota; sono tuttora in corso studi clinici volti a stabilirla. Come per tutti i vaccini, la vaccinazione con Comirnaty potrebbe non proteggere tutti coloro che lo ricevono. I soggetti potrebbero non essere completamente protetti fino a 7 giorni dopo la seconda dose del vaccino. E' pertanto essenziale continuare a seguire scrupolosamente le raccomandazioni di sanità pubblica (mascherina, distanziamento e lavaggio frequente delle mani).

Come viene somministrato Comirnaty

Comirnaty viene somministrato dopo diluizione sotto forma di iniezione intramuscolare nella parte superiore del braccio. E' previsto un richiamo ed è raccomandabile che la seconda dose dello stesso vaccino sia somministrata 3 settimane dopo la prima dose per completare il ciclo di vaccinazione.

E' molto importante che venga eseguita la seconda somministrazione per ottenere una risposta immunitaria ottimale. Qualora dimenticasse di tornare alla data prestabilita per la seconda somministrazione si rivolga al suo medico curante o al centro vaccinale dove è stata somministrata la prima dose.

Possibili effetti indesiderati

Come tutti i vaccini, Comirnaty può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino.

Effetti indesiderati molto comuni (possono interessare più di 1 persona su 10)

- Nel sito di iniezione: dolore, gonfiore
- Stanchezza
- Mal di testa
- Dolore muscolare
- Dolore articolare



Diagnostica per Immagini
Teleradiologia
Direttore Sanitario
Dott. Giacomo Barbalace



PT 34 Rev.00 del 17/03/2021
Protocollo vaccinazione Pfizer BioNTech

- Brividi, febbre

Effetti indesiderati comuni (possono interessare fino a 1 persona su 10)

- Arrossamento nel sito di iniezione
- Nausea

Effetti indesiderati non comuni (possono interessare fino a 1 persona su 100)

- Ingrossamento dei linfonodi
- Senso di malessere
- Dolore agli arti
- Insonnia
- Prurito nel sito di iniezione

Effetti indesiderati rari (possono interessare fino a 1 persona su 1000): asimmetria temporanea di un lato del viso.

Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili): reazione allergica grave.

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, anche se non elencati sopra, si rivolga al medico curante o contatti il centro vaccinale.

Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione (<https://www.aifa.gov.it/content/segalazioni-reazioni-avverse>).

Cosa contiene Comirnaty

Il principio attivo è un vaccino a mRNA anti COVID-19.

Gli altri componenti sono: ((4-idrossibutil)azanedil)bis(esano-6,1-diil)bis(2-esildecanoato) (ALC-0315); 2-((polietilenglicole)-2000)-N,N-ditetradecilacetammide (ALC-0159); 1,2-distearoil-sn-glicerico-3-fosfocolina (DSPC); colesterolo; potassio cloruro; potassio diidrogeno fosfato; sodio cloruro; fosfato disodico diidratato; saccarosio; acqua per preparazioni iniettabili.



Diagnostica per Immagini
Teleradiologia
Direttore Sanitario
Dott. Giacomo Barbalace



PT 34 Rev.00 del 17/03/2021
Protocollo vaccinazione Pfizer BioNTech

SEZIONE C Allegato al modulo di consenso informato SCHEDA ANAMNESTICA

Da compilare a cura del Vaccinando e da riesaminare insieme ai Professionisti Sanitari addetti alla vaccinazione

Nome e Cognome		Telefono:		
Anamnesi		SI	NO	NON SO
Attualmente è malato?				
Ha febbre?				
Soffre di allergie al lattice, a qualche cibo, a farmaci o ai componenti del vaccino? Se si specificare:.....				
Ha mai avuto una reazione grave dopo aver ricevuto un vaccino?				
Soffre di malattie cardiache o polmonari, asma, malattie renali, diabete, anemia o altre malattie del sangue?				
Si trova in una situazione di compromissione del sistema immunitario? (es. cancro, leucemia, linfoma HIV/AIDS, trapianto?)				
Negli ultimi 3 mesi ha assunto farmaci che indeboliscono il sistema immunitario (es cortisone prednisone) o farmaci antitumorali, oppure ha subito trattamenti con radiazioni?				
Durante lo scorso anno, ha ricevuto una trasfusione di sangue o prodotti ematici, oppure le sono stati somministrati immunoglobuline (gamma) o farmaci antivirali?				
Ha avuto attacchi di convulsioni o qualche problema al cervello o al sistema nervoso?				
Ha ricevuto vaccinazioni nelle ultime 4 settimane? Se si quali/e?.....				
Per le donne: è in cinta o sta pensando di rimanere incinta nel mese successivo alla prima o alla seconda vaccinazione?				



Diagnostica per Immagini
 Teleradiologia
 Direttore Sanitario
 Dott. Giacomo Barbalace



PT 34 Rev.00 del 17/03/2021
Protocollo vaccinazione Pfizer BioNTech

Sta allattando?			
-----------------	--	--	--

Specifichi di seguito i farmaci, ed in particolare quelli anticoagulanti, nonché gli integratori naturali, le vitamine, i minerali o eventuali medicinali alternativi che sta assumendo:

.....

Anamnesi COVID correlata	SI	NO	NON SO
Nell'ultimo mese è stato in contatto con una persona contagiata da Sars-CoV2 o affetta da COVID-19			
Manifesta uno dei seguenti sintomi:			
• Tosse/raffreddore/febbre/dispnea o sintomi simil-influenzali			
• Mal di gola/perdita dell'olfatto o del gusto?			
• Dolore addominale/diarrea?			
• Lividi anormali o sanguinamento/arrossamento degli occhi?			
Ha fatto qualche viaggio internazionale nell'ultimo mese?			
Test COVID 19:			
• Nessun test COVID-19 recente			
• Test Covid-19 negativo (Data.....)			
• Test COVID-19 positivo (Data.....)			
• In attesa di test COVID-19 (Data.....)			



Diagnostica per Immagini
Teleradiologia
Direttore Sanitario
Dott. Giacomo Barbalace



PT 34 Rev.00 del 17/03/2021
Protocollo vaccinazione Pfizer BioNTech

Riferisca altre patologie o notizie utili sul Suo stato di salute:

.....
.....
.....
.....
.....

Documento approvato dal Direttore Sanitario